ニボルマブ単剤（14日間/1サイクル）　悪性黒色腫

催吐リスク　Minimum　　皮　nibo240d1c14d

薬剤名	投与経路	投与量		希釈液			点滴時間（分）	投与日(day)
			mg			mL		
			mg					
			mg					
			mg					
オプジーボ	240	mg/body		生食	100	mL	30	1
						mL		
						mL		
						mL		
						mL		
						mL		

内服薬

投与基準等

Ⅱ. 投与基準（例：白血球≧2000/mm³、好中球≧1000/mm³）

重篤な感染症がない

重篤な間質性肺炎がない

重篤な消化器毒性がない

重篤な甲状腺機能障害がない

Ⅲ. 減量基準（例：Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量）

なし

Ⅳ. 重大な副作用（例:好中球減少　Grade3 以上37．5%）

間質性肺疾患(2.9%)、AST(GOT)増加(14.3%)、ALT(GPT)増加(11.4%)、γ-GTP 増加(11.4%)、Al-P 増加(14.3%)等を伴う肝機能障害(5.7%)、肝炎(頻度不明)、大腸炎(頻度不明)、

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)

インタビューフォーム

N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):320-30.

Lancet Oncol. 2015 Apr;16(4):375-84.