


# TC療法を 受けられる患者様へ


## TC療法について

TC療法とは、ドセタキセル(T)、シクロホスファミド(C)という  
違う作用の抗がん剤を組み合わせる治療です。



## 投与スケジュール 今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目に2種類の抗がん剤を投与します。  
後の20日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、  
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。

ドセタキセル  
(    mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

シクロホスファミド  
(    mg)

抗がん剤です。  
膀胱炎を起こすことがあります。  
30分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。



お薬を続けていくと爪がでこぼこ  
になったり、もろくなります。  
冷やすことで予防できますので、  
抗がん剤投与前からフローズン  
グローブ・ソックスを着用しま  
す。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 浮腫  
味覚の変化  
末梢神経障害  
爪の変形

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。  
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。






肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

## 内服薬について

| 1日目 | 2日目   | 3日目   | 4日目   |
|-----|---|---|---|
|     |  |  |  |

吐き気止め・浮腫予防のお薬です。症状が無くても服用してください。

自覚できない副作用