

# パクリタキセル療法を受けられる患者様へ

## パクリタキセル療法について

パクリタキセルとは、細胞分裂に重要な役割を果たす微小管の働きを抑えて、がん細胞の増殖を抑える抗がん剤です。

## 投与スケジュール今日（ / ）は サイクル 日目

1日目、8日目、15日目にパクリタキセルを投与します。  
21日間を一区切り(1コース)とします。

抗がん剤 投与 1日目	休薬 6日間	抗がん剤 投与 8日目	休薬 6日間	抗がん剤 投与 15日目	休薬 6日間
-------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	-----------

1コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
クロルフェニラミン  
ファモチジン

吐き気とアレルギーを予防します。  
30分かけて投与します。

パクリタキセル  
( mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

パクリタキセルはアルコール（ビールでコップ1杯程度）を含んでいますので、お酒を飲んだ時のような症状（顔がほてる、眠気等）が現れることがあります。  
点滴をする日に車で来院することは控えてください。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
筋肉痛・関節痛


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。痛みがひどい場合、痛み止めを使うことができます。遠慮せずに申し出てください。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛  
味覚の変化  
末梢神経障害

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかりと行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。