

| 催吐リスク | | 乳 術後Pembro200/c21d×9 | | | | | | |
|--------|------|----------------------|---------|----|---------|----------|----|---|
| 薬剤名 | 投与経路 | 投与量 | 希釈液 | | 点滴時間(分) | 投与日(day) | | |
| | | | mg | | | | | |
| | | | mg | | | | | |
| | | | mg | | | | | |
| | | | mg | | mL | | | |
| キイトルーダ | | 200 | mg/body | 生食 | 100 | mL | 30 | 1 |
| | | | | | | mL | | |
| | | | | | | mL | | |
| | | | | | | mL | | |
| | | | | | | mL | | |

内服薬

投与基準等

I. 投与に際しての注意事項

術前①Pembro+wTC 療法 4 サイクル施行後に術前②Pembro+AC 療法 4 サイクル施行
術後 Pembro200mg を9サイクル施行 or Pembro400mg を 5 サイクル施行

II. 投与・休薬基準 (例:白血球 $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球 $\geq 1000/\text{mm}^3$)

キイトルーダによる irAE

6週以内にプレドニゾン換算10mg 以下のステロイドでコントロール可能にならなければ投与中止

好中球 $\geq 1500/\text{mm}^3$ 血小板 $\geq 100,000/\mu\text{L}$ Hb $\geq 9.0\text{g/dL}$ Scr ≤ 1.5 Ccr $\geq 50\text{mL/min}$ T-Bill ≤ 1.5 AST,ALT $\geq 2.5 \times \text{ULN}$

Ⅲ. 減量基準（例:Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量）

キイトルーダ

減量基準なし

Ⅳ. 重大な副作用（例:好中球減少 Grade3 以上37. 5%）

Grade3以上 貧血18%、好中球減少34. 5%、irAE12. 9%

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)

N Engl J Med 2022;386:556-567 Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer

