


# EP療法を 受けられる患者様へ


## EP療法について

EP療法とは、エトポシド(E)とシスプラチン(P)という  
違う作用の抗がん剤を組み合わせる治療です。



## 投与スケジュール 今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目は2種類、2日目と3日目はエトポシドのみ投与します。  
21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、  
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

生理食塩液  
カリウム、マグネシウム

腎臓への障害を予防します。  
60分かけて投与します。



デキサメタゾン\*  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
15分かけて投与します。



エトポシド\*  
(    mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。



シスプラチン  
(    mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。



フロセミド  
生理食塩液\*

利尿剤です。  
腎臓への障害を予防します。  
60分かけて投与します。

2日目と3日目は\*印のお薬を投与します。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかりと行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

## 内服薬について

1日目	2日目/3日目	4日目/5日目
オランザピン	オランザピン	オランザピン

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。