

ベバシズマブを 投与される患者様へ

この治療について

ベバシズマブ(商品名;アバスチン)を単独またはほかの抗がん剤を組み合わせ使用して使用する治療です。
ベバシズマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。

投与スケジュール 今日 (/) は サイクル 日目

1日目に抗がん剤を点滴で投与します。
21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

ベバシズマブ
(mg)

抗がん剤です。
初回90分、2回目60分、3回目以降
30分かけて投与します。



生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

副作用について

アレルギー反応

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、
すぐにお伝えください。

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。
重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。

その他にも気になる症状がありましたら、
お気軽に医療スタッフまでご相談ください。