

# シスプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ療法を受けられる患者様へ


## 治療について

この療法は、シスプラチンとペメトレキセド（商品名;アリムタ）とベバシズマブ（商品名;アバスチン）という違う作用の抗がん剤を組み合わせる治療です。

ベバシズマブはがん細胞に伸びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。分子標的薬とも呼ばれています。

## 投与スケジュール 今日（ / ）は サイクル 日目

1日目に2種類の抗がん剤を点滴で投与します。21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

生理食塩液  
カリウム、マグネシウム

腎臓への障害を予防します。  
60分かけて投与します。

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
15分かけて投与します。

ベバシズマブ ( mg)

抗がん剤です。  
30分かけて投与します。

ペメトレキセド ( mg)

抗がん剤です。  
10分かけて投与します。

生理食塩液

お薬の間隔をあげるために  
30分かけて投与します。

シスプラチン ( mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

フロセミド  
生理食塩液

利尿剤です。  
腎臓への障害を予防します。  
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗い・うがいをしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

## ベバシズマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。

## 内服薬について

1日目	2日目	3日目	4日目

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

## 副作用を予防する薬について

ビタミンB12

9週ごとに筋肉注射をします。

葉酸（商品名;パンビタン）

1日1回 服用します。