

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ療法を受けられる患者様へ

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ療法について

パクリタキセルとカルボプラチンとベバシズマブ（商品名：アバスチン）という違う作用の抗がん剤を組み合わせで行う治療です。

投与スケジュール 今日(/)は サイクル 日目

21日間を一区切り(1コース)とします。

抗がん剤 投与 1日目	休薬 20日間	抗がん剤 投与 1日目	休薬 20日間
-------------------	------------	-------------------	------------

1コース目

2コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
ファモチジン
クロルフェニラミン
パロノセトロン

吐き気止め、アレルギー予防のお薬です。
30分かけて投与します。

↓

パクリタキセル (mg)

抗がん剤です。
3時間かけて投与します。

↓

カルボプラチン (mg)

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

↓

ベバシズマブ (mg)

抗がん剤です。
初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与します。

↓

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

パクリタキセルはアルコール（ビールで中瓶1本程度）を含んでいますので、お酒を飲んだ時のような症状（顔がほてる、眠気等）が現れることがあります。
点滴をする日に車で来院することは控えてください。

副作用について

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
筋肉痛・関節痛


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛
末梢神経障害
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。



肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗い・うがいをしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

内服薬について

1日目	2日目	3日目

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

ベバシズマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。
重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。