

催吐リスク Low

卵 DOX50/d1/c28d

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間 (分)	投与日(day)
デキサメタゾン	注射	6.6	mg 生食	100 mL 30	1
ドキシル	50	mg/m ²	5%糖液	500 mL 60	1
				mL	

内服薬

投与基準等

II. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/mm^3$ 、好中球 $\geq 1000/mm^3$)

白血球 $\geq 3000/mm^3$ 好中球 $1500/mm^3$ 以上

血小板 $75000/mm^3$

Bil $1.2mg/dl$ 未満

手足症候群
口内炎

> Grade 1以下 (日常の活動に妨げない軽度の
紅斑、腫脹)

→ (痛みのない潰瘍、紅斑又は
軽度の痛み)

Ⅲ. 減量基準 (例: Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)

- 好中球 $500 / \text{mm}^3$ 未満が 7日以上連続する~~場合~~
- 血小板 $25000 / \text{mm}^3$ 未満を認められた場合
- BIL $1.2 - 3.0 \text{ mg/dl}$ のとき 25% 減
 3.0 mg/dl のとき 50% 減
- 手足症候群が Grade 3.4 以上の時 (歩行又は正常な日常生活が妨げられる程度の水膨、潰瘍又は腫脹、普段の衣服を着ることができない)

Ⅳ. 重大な副作用 (例: 好中球減少 Grade3 以上 37.5%)

Ⅳ. 重大な副作用 (例: 好中球減少 Grade3 以上 37.5%)

- ① 心臓障害
- ② 手足症候群 — 78.4% にあり
- ③ 口内炎 — 77% にあり
- ④ infusion reaction (ほてり, 発熱, 悪寒, 頭痛)

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)

ドキシル適正使用ガイド