


封入型ドキシソルビシン療法を 受けられる患者様へ

封入型ドキシソルビシン療法について

ドキシソルビシンとは、
がん細胞の分裂を阻害して腫瘍の増殖を抑える抗がん剤です。
ドキシソルビシンがより効果的にがん細胞に取り込まれるように
特殊な膜で薬を封入しています（商品名;ドキシル）。

投与スケジュール 今日（ / ）は サイクル 日目

1日目にドキシソルビシンを投与します。
後の27日間を休みとし、28日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン

吐き気止めのお薬です。
30分かけて投与します。

ドキシソルビシン
(mg)

抗がん剤です。
尿の色が赤くなることがあります。
60分かけて投与します。

ブドウ糖液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

手足症候群

手足が赤くなる、ひりひりする、皮がむける、水泡ができるなどの症状があります。



肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

