

TC+ベバシズマブ療法を受けられる患者様へ

TC+ベバシズマブ療法について

パクリタキセルとカルボプラチントとベバシズマブ（商品名：アバスチン）という違う作用の抗がん剤を組み合わせて行う治療です。

ベバシズマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。

投与スケジュール 今日(/)は サイクル 日目

21日間を一区切り(1コース)とします。

抗がん剤 投与 1日目	休薬	抗がん剤 投与 1日目	休薬
	20日間		20日間

1コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
ファモチジン
クロルフェニラミン
パロノセトロン

パクリタキセル (mg)

カルボプラチナン (mg)

ベバシズマブ (mg)

生理食塩液

吐き気止め、アレルギー予防のお薬です。
30分かけて投与します。

抗がん剤です。
3時間かけて投与します。

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

抗がん剤です。
初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与します。

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

パクリタキセルはアルコール（ビールで中瓶1本程度）を含んでいますので、お酒を飲んだ時のような症状（顔がほてる、眠気等）が現れることがあります。
点滴をする日に車で来院することは控えてください。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、
すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
筋肉痛・関節痛


気持ちが悪い時には我慢せずに
申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。
遠慮せずに申し出てください。

脱毛
末梢神経障害
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで
再び生えてきます。
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状
が現れたら、お伝えください。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗い・うがいをしっかり
行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は
病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、
お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

内服薬について

1日目	2日目	3日目	4日目
			

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くとも服用してください。

ベバシズマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧、タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することができます。
重篤な副作用として、**出血、消化管穿孔、血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部

川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181