


# ノギテカン+ベバシズマブ療法を受けられる患者様へ

## ノギテカン+ベバシズマブ療法について

ノギテカン（商品名;ハイカムチン）とは、がん細胞の分裂を阻害して腫瘍の増殖を抑える抗がん剤です。ベバシズマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。

## 投与スケジュール 今日（ / ）は サイクル 日目

1~5日目にノギテカンを、1日目のみベバシズマブを投与します。後の16日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。

ノギテカン ( mg)

抗がん剤です。  
30分かけて投与します。

ベバシズマブ ( mg)

抗がん剤です。  
初回90分、2回目60分、3回目以降  
30分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐


熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感

気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。



## 副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。