


FOLFOX療法を 受けられる患者様へ

FOLFOX療法について

この療法は、オキサリプラチンとフルオロウラシルという注射薬を
組み合わせて行います。
オキサリプラチンとフルオロウラシルはがん細胞に作用して、
がん細胞の増殖を抑制します。

投与スケジュール 今日 (/) は サイクル 日目

1日目に2種類の抗がん剤を投与します。
その内、フルオロウラシルは46時間かけて投与します。
(3日目に針を抜きます)
後の11日間を休みとし、14日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。
30分かけて投与します。



オキサリプラチン (mg)

抗がん剤です。
120分かけて投与します。



レボホリナート

フルオロウラシルの効果を高めます。
オキサリプラチンと同時に
120分かけて投与します。



フルオロウラシル (mg)

抗がん剤です。
5分かけて投与します。



フルオロウラシル (mg)

抗がん剤です。
46時間かけて投与します。
携帯用ポンプで持ち帰ります。

内服薬について

1日目	2日目	3日目

吐き気予防のお薬です。吐き気が無くても服用してください。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。


遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
しびれ

気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。冷たいものに触れるとしびれが起きやすくなります。手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

色素沈着
味覚の変化



肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。