

# SOX療法を 受けられる患者様へ

## SOX療法について

この療法は、オキサリプラチン(商品名;エルプラット)という注射薬とティーエスワンという経口薬を組み合わせで行います。オキサリプラチンとティーエスワンはがん細胞に作用して、増殖を抑制します。

## 投与スケジュール 今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目に注射薬を投与します。  
1日目の夕から15日目の朝(14日間)にティーエスワンを服用します。  
21日間を一区切り(1コース)とします。

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-21 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-------|
| 注射薬   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |       |
| 経口薬・朝 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |       |
| 経口薬・夕 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |       |

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。



オキサリプラチン  
(     mg)

抗腫瘍薬です。  
血管痛を起こすことがあります。  
120分かけて投与します。



生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 内服薬について

1日目

2日目

3日目



吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

# 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
末梢神経障害  
手足症候群

気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。冷たいものに触れるとしびれが起きやすくなります。手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。

口内炎 下痢  
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

色素沈着  
味覚の変化



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。