

# ベバシズマブ+FOLFOX療法を受けられる患者様へ

## ベバシズマブ+FOLFOX療法について

この療法は、ベバシズマブ(商品名;アバスチン)とオキサリプラチニン(商品名;エルプラット)とフルオロウラシルという注射薬を組み合わせて行います。

オキサリプラチニンとフルオロウラシルはがん細胞に作用して、がん細胞の増殖を抑制します。


一方、ベバシズマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。

## 投与スケジュール

1日目に3種類の抗がん剤を投与します。

その内、フルオロウラシルは46時間かけて投与します。  
(3日目に針を抜きます)

後の11日間を休みとし、14日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。

ベバシズマブ ( mg)

抗腫瘍薬です。  
初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与します。

生食

お薬を洗い流します。

オキサリプラチニン ( mg)

抗がん剤です。  
120分かけて投与します。

レボホリナート

フルオロウラシルの効果を高めます。  
オキサリプラチニンと一緒に  
120分かけて投与します。

フルオロウラシル ( mg)

抗腫瘍薬です。  
5分かけて投与します。

フルオロウラシル ( mg)

抗腫瘍薬です。  
46時間かけて投与します。

生食

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 副作用について

### 自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐 下痢

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、  
すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
手足症候群


気持ちが悪い時には我慢せずに  
申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢  
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。  
遠慮せずに申し出てください。

脱毛 色素沈着  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで  
再び生えてきます。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり  
行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は  
病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、  
お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

## ベバシズマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。

### 内服薬について

1日目	2日目	3日目

吐き気予防のお薬です。吐き気が無くとも服用してください。

■ 日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部

川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181