

催吐リスク Moderate

腸 FOLFIRI+BEV5・10/biweekly

薬剤名	投与経路	投与量	希釀液		点滴時間 (分)	投与日(day)
			mg	mg		
			mg	mg		
パロノセトロン	注射	0.75	mg			1
デキサメタゾン	注射	6.6	mg	生食	100 mL	30 1
アバスチン		5	mg/kg	生食	100 mL	10 1
イリノテカン		150	mg/m2	5%糖液	250 mL	90 1
レボホリナート		200	mg/m2	5%糖液	250 mL	120 1
5-FU		400	mg/m2	5%糖液	50 mL	全開 1
5-FU		2400	mg/m2	生食		mL 46h 1-3

内服薬

デキサメタゾン 8mg 分2 朝昼食後 day2,3,4

投与基準等

II. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球 $\geq 1000/\text{mm}^3$)好中球数 $\geq 1,500$ 、血小板数 $\geq 75,000$ 、下痢・口内炎 $\leq \text{Grade}1$

III. 減量基準（例：Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量）

ベバシズマブ(アバスチン)

減量基準なし

FOLFIRI

好中球数<500、血小板<50,000、Grade3 以上の消化器系有害事象発現時、次回より投与量を80%に減量

IV. 重大な副作用（例：好中球減少 Grade3 以上 37.5%）

高血圧	Grade3 以上	0.37% （国内特定使用成績調査）
出血		1.37%
蛋白尿		0.04%
消化管穿孔		0.93%
創傷治癒遅延		0.30%
動脈血栓塞栓症		0.33%
静脈血栓塞栓症		1.67%

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)