

# ベバシズマブ + XELOX療法を 受けられる患者様へ

## ベバシズマブ + XELOX療法について

この療法は、ベバシズマブ(商品名;アバスチン)とオキサリプラチン(商品名;エルプラット)という2種類の注射薬とカペシタビン(商品名;ゼローダ)という経口薬を組み合わせで行います。オキサリプラチンとカペシタビンは直接がん細胞に作用して、増殖を抑制します。一方、ベバシズマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。

## 投与スケジュール今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目に2種類の注射薬を投与します。  
1日目の夕から15日目の朝(14日間)にカペシタビンを服用します。  
21日間を一区切り(1コース)とします。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-21
注射薬																
経口薬・朝																
経口薬・夕																

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。

ベバシズマブ  
( mg)

抗腫瘍薬です。  
初回90分、2回目60分、3回目以降  
30分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

オキサリプラチン  
( mg)

抗腫瘍薬です。  
血管痛を起こすことがあります。  
120分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 内服薬について

1日目

2日目

3日目



吐き気予防のお薬です。吐き気が無くても服用してください。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
末梢神経障害  
手足症候群


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。冷たいものに触れるとしびれが起きやすくなります。手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

## ベバシズマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。