

# セツキシマブ+SOX療法を 受けられる患者様へ

## セツキシマブ+SOX療法について

この療法は、セツキシマブ+オキサリプラチン(商品名;エルプラット)という注射薬とティーエスワンという経口薬を組み合わせで行います。  
セツキシマブとオキサリプラチンとティーエスワンはがん細胞に作用して、増殖を抑制します。

## 投与スケジュール

1日目に2種類の注射薬を投与します。8日目と15日目はセツキシマブのみ投与します。  
1日目の夕から15日目の朝(14日間)にティーエスワンを服用します。  
21日間を一区切り(1コース)とします。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-21
注射薬																
経口薬・朝																
経口薬・夕																

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン\*  
パロノセトロン  
クロルフェニラミン\*

吐き気止め、アレルギー予防のお薬です。  
30分かけて投与します。

セツキシマブ\*  
( mg)

抗がん剤です。  
初回120分、2回目から60分かけて投与します。

生理食塩水\*

お薬を洗い流します。  
初回60分、2回目以降30分かけて投与します。

オキサリプラチン  
( mg)

抗がん剤です。  
血管痛を起こすことがあります。  
120分かけて投与します。

生理食塩水

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

8日目と15日目は\*印のお薬を投与します。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
末梢神経障害  
手足症候群


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。冷たいものに触れるとしびれが起きやすくなります。手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。

口内炎 下痢  
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 色素沈着  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗い・うがいをしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

自覚できない副作用


## 内服薬について

1日目	2日目	3日目
		

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

## セツキシマブの副作用について

主な皮膚障害の発現時期と、重症度の推移



投与初期からにきびのようなかゆみを伴う皮疹や乾燥が現れます。保湿が一番の予防になりますので、処方されている保湿剤や塗り薬を普段からこまめに使うようにしましょう。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部  
川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181