

SP療法を受けられる患者様へ

SP療法について

SP療法は、ティーエスワン(S)とシスプラチン(P)という2種類の抗がん剤を用いて行う治療です。ティーエスワンとシスプラチンはがん細胞のDNAの合成を阻害して、がん細胞の増殖を抑える抗がん剤です。

投与スケジュール 今日 (/) は サイクル 日目

8日目にシスプラチンを投与します。
1日目の夕から22日目の朝(21日間)にティーエスワンを服用します。
35日間を一区切り(1コース)とします。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21	22	23-35
注射薬																
経口薬・朝																
経口薬・夕																

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

生理食塩液
カリウム、マグネシウム

腎臓への障害を予防します。
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

デキサメタゾン
パロノセトロン

吐き気止めのお薬です。
30分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

シスプラチン
(mg)

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

細胞外液、フロセミド

利尿剤です。
腎臓への障害を予防します。
60分かけて投与します。

細胞外液

腎臓への障害を予防します。
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
しゃっくり
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 色素沈着
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

内服薬について

8日目	9日目	10日目	11日目
			
			
オランザピン	オランザピン	オランザピン	オランザピン

吐き気止めのお薬です。吐き気が無くても服用してください。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部

川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181