

# ドセタキセル+S-1療法を 受けられる患者様へ

## ドセタキセル+S-1療法について

ドセタキセルという注射薬と、ティーエスワンという経口薬を組み合わせて行います。  
ドセタキセルとティーエスワンはがん細胞に作用して、増殖を抑制します。

## 投与スケジュール今日（ / ）は サイクル 日目

1日目に注射薬を投与します。  
1日目の夕から15日目の朝(14日間)にティーエスワンを服用します。  
21日間を一区切り(1サイクル)とします。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16~20
注射薬	●															
経口薬・朝		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
経口薬・夕		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ここに示したスケジュールは参考であり、  
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン

吐き気、浮腫を予防する薬です。  
30分かけて投与します。

ドセタキセル ( mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。



お薬を続けていくと爪がでこぼこになったり、もろくなります。  
冷やすことで予防できますので、  
抗がん剤投与前からフローズン  
グローブ・ソックスを着用します。

## 内服薬について

1日目	2日目	3日目	4日目

浮腫予防のお薬です。症状が無くても服用してください。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 浮腫  
味覚の変化  
末梢神経障害  
爪の変形

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。  
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

## 治療全体の流れ

- 1サイクル目 ティーエスワン 1日2回 14日間服用7日間休薬
- 2 }  
3 }  
4 } サイクル目  
5 } ドセタキセル 1日目  
6 } ティーエスワン 1日2回 14日間服用7日間休薬  
7 }
- 8 }  
9 } サイクル目  
10 } ティーエスワン 1日2回 28日間服用14日間休薬  
11 }

ドセタキセルを6サイクル投与したあとは、ティーエスワンを28日間服用14日間休薬に変更して4サイクル服用します。