

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： HDLY-105

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|---|-------|------------------------------------|
| ホジキンリンパ腫 (CD30陽性) | Brentuximab vedotin療法 | 21日間 | 規定なし | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | 軽度 | J Clin Oncol. 2012; 30: 2183-2189. |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | デキサート 生理食塩液 | 6.6mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | アドセトリス 生理食塩液 | 1.8mg/kg 50/100mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アドセトリス希釈液量：30≤Bw≤85kg 100mL、Bw>85kg 250mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<注意事項/備考>

- ✓ 点滴開始(デキサート)と同時にアレルギー予防のブルフェン・ボラミン内服
- ✓ 末梢神経障害 Grade2,3→休薬し回復後、1.2mg/kgに減量して投与再開
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓