【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： RCC-117

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
腎細胞がん	Nivolumab+ Cabozantinib	14日間 or 28日間	最大2年	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	軽度	CheckMate 9ER試験, Choueiri TK et al.: N Engl J Med. 2021: 384(9): 829-841.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2												14	15
【2週間隔で投与する場合】																			
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓
②	オプジーボ 生理食塩液	240mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓														↓
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2																										28	29
【4週間隔で投与する場合】																																	↓
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																												↓
②	オプジーボ 生理食塩液	480mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓																												↓
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																												
	カボメティクス	40mg	内服	1日1回	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

＜注意事項/備考＞

- ✓ Nivolumab：0.2～1.2μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ Nivolumab、Cabozantinibどちらに起因する有害事象か判断し、1剤または2剤とも休薬、中止を判断できる。
- ✓ Cabozantinib：歯科の手術や大手術の際は28日前には休薬
- ✓ Cabozantinib：高血圧に注意