

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-103

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	THP - COP療法 (80歳未満高齢者)	28日間	6~8コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	N Engl J Med. 1993; 328: 1002-1006. Ann Oncol. 2002; 13: 1347-1355.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																											
②	テラルピシン 生理食塩液	30mg/m ² 50mL	点滴静注	5分	↓																											
③	オンコピン 生理食塩液	1.0mg/m ² 50mL	点滴静注	5分	↓																											
④	エンドキサン 生理食塩液	500mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓																											
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
⑥	プレドニン錠 (or 100mg/Body)	40mg/m ²	内服		↓	↓	↓	↓	↓																							

＜注意事項/備考＞

- ✓ 高齢者用レジメン(80歳未満)
- ✓ THP：アントラサイクリン系薬剤を使用した前治療歴確認、累積投与量950mg/m²以上で心筋障害発生リスク↑、治療開始前には心エコー検査を
- ✓ VCR：1回最大用量は2mgまで(神経毒性が起こるため)
- ✓ CPA：十分な水分の摂取と頻回な排尿を心がける
- ✓
- ✓