【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NHL-104

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
非ホジキンリンパ腫	THP - COP療法 （80歳以上高齢者）	28日間	6～8コース	□ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク
高

根拠
N Engl J Med. 1993; 328: 1002-1006. Ann Oncol. 2002; 13: 1347-1355.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																										
②	テラルビシン 生理食塩液	20mg/㎡ 50mL	点滴静注	5分	↓																										
③	オンコビン 生理食塩液	1.0mg/㎡ 50mL	点滴静注	5分	↓																										
④	エンドキサン 生理食塩液	350mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓																										
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																										
⑥	プレドニン錠	30㎎/㎡	内服		↓	↓	↓	↓	↓																						

＜注意事項/備考＞

✓ 高齢者用レジメン(80歳以上)
✓ THP：アントラサイクリン系薬剤を使用した前治療歴確認、累積投与量950㎎/㎡以上で心筋障害発生リスク↑、治療開始前には心エコー検査を
✓ VCR：1回最大用量は2㎎まで(神経毒性が起こるため)
✓ CPA：十分な水分の摂取と頻回な排尿を心がける
✓
✓