【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NHL-121

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
非ホジキンリンパ腫	BR療法 (R-Bendamusutine)	28日間	6コース	□ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク
中

根拠
Blood. 2009; 114: abstr 405. Lancet. 2013; 381: 1203-1210.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/㎡ 500mL	点滴静注	医師指示	↓																									
②	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																									
	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分		↓																								
③	ベンダムスチン 生理食塩液	90mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓	↓																								
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																								
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																								

＜注意事項/備考＞

✓ 適応：低悪性度B細胞性NHLおよびMCL

✓ Infusion reaction予防としてリツキシマブ投与前にでブルフェン200㎎・ポララミン2㎎内服(ソルコーテフ適宜使用可)

✓ 血管痛予防のためベンダムスチン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与

✓ 2024/04よりトレアキシンからベンダムスチンへ変更。