

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-126

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	Brentuximab vedotin	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Clin Oncol. 2012; 30: 2183-2189.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート	6.6mg	点滴静注	30分	↓																				
	生理食塩液	50mL																							
②	アドセトリス	1.8mg/kg	点滴静注	30分	↓																				
	生理食塩液	100/250mL																							
	アドセトリス希釈液量 30≤Bw≤85kg⇒100mL Bw>85kg⇒250mL																								
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

- ✓ 適応：CD30陽性未分化大細胞リンパ腫
- ✓ アレルギー予防として点滴開始(DEX)と同時にブルフェン・ポララミン内服
- ✓ 末梢神経障害 Grade2,3の場合→休薬、Grade1に回復後アドセトリス1.2mg/kgに減量して再開