

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-145

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
DLBCL	Pola+R-CHP	21日間	6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	N Engl J Med. 2022; 386(4): 351-363. (POLARIX試験)

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	医師指示	↓																											
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	初回30分 2回目～5分	↓																											
③	ポライビー 生理食塩液	1.8mg/kg 50/100mL	点滴静注	初回90分 2回目～30分	↓																											
※体重<45kgの場合は生理食塩液50mLに希釈																																
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	初回30分 2回目～5分	↓																											
⑤	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																											
⑥	ドキシソルピシン 生理食塩液	50mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	10分	↓																											
⑦	エンドキサン 生理食塩液	750mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓																											
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
⑨	プレドニン錠	100mg	内服		↓	↓	↓	↓	↓																							

## <注意事項/備考>

- ✓ Infusion reaction 予防としてリツキシマブ投与前にブルフェン200mg・ポララミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
- ✓ DXR：アントラサイクリン系薬剤を使用した前治療歴確認、累積投与量500mg/m<sup>2</sup>以上で心筋障害発生リスク↑
- ✓ 治療開始前には心エコー検査
- ✓ CPA：十分な水分の摂取と頻回な排尿を心がける
- ✓ ポライビー：初回90分、2回目以降30分で投与