

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： CxC-105

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
子宮頸がん	Topotecan+PTX±Bv	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	N Engl J Med 370:734-743,2014

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート ファモチジン ポラミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	バクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																				
③	ハイカムチン 生理食塩液	0.75mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑤	アバスチン* 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目~ 30分	↓																				
⑥	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑦	デキサート 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注	15分		↓	↓																		
⑧	ハイカムチン 生理食塩液	0.75mg/m ² 100mL	点滴静注	30分		↓	↓																		
⑨	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分		↓	↓																		

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓
- ✓

✓