【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-178

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺がん（非扁平上皮）	Atezolizumab +CBDCA/PTX +Bv（ABCP療法）	21日間	4-6コース+α	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	高/中	N Engl J Med 378: 2288-2301, 2018

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	テセントリク 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	初回60分 2回目～30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
④	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
⑤	アロキシ 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
⑥	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/㎡ 500mL	点滴静注	180分	↓																				
⑦	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑨	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～ 30分	↓																				
⑩	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
	上記4-6コース施行後、維持療法（Atezolizumab(day1)+Bv(day1) q3w）を病勢進行まで施行																								

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー症状に注意
- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓ Atezolizumab：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与