

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NSC-192

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab	下記参照	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	最小度	N Engl J Med.2019;381:2020-31

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1				8					15					22					29					36		43	
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓												↓											↓				
②	オブジーボ 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓												↓											↓				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																							↓				
④	ヤーボイ 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴静注	30分	↓																							↓				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓												↓											↓				

<注意事項/備考>

- ✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽(空咳)など、胸部X線検査やSpO2モニタリングなどで定期的なモニタリングを
- ✓ 血糖上昇：口渇、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意、来院時には血糖値の測定を
- ✓ 大腸炎・下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など
- ✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にTSH、FT3、FT4などの検査を
- ✓ 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓