

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： EmC-106A

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐 リスク | 根拠 |
|------|-------------------|-------|--------|---|-----------|---|
| 子宮体癌 | Durvalumab+ TC | 21日間 | 4-6コース | <input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他 | 中 | <DUO-E> J Clin Oncol 2023; 42: 283-299. |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与 経路 | 投与 時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | イミフィンジ 生理食塩液 | 1120mg/body 100mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | アロカリス パロノセトロン | 235mg 0.75mg/50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液 | 19.8mg 20mg 5mg 50mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | パクリタキセル 生理食塩液 | 175mg/m ² 500mL | 点滴静注 | 180分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | カルボプラチナ 5%ブドウ糖液 | AUC 5 250mL | 点滴静注 | 60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<注意事項/備考>

- ✓ Durvalumab : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ PTX : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX : ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓

✓
✓

:»

—