

《無断轉載禁止》

レジメン番号： NSC-216(BW $\geq$ 80kg)

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
非小細胞 肺がん (非扁平上皮)	Amivantamab+ CBDCA+PEM	21日間		☒ 進行/再発 ☐ 術後補助化学療法 ☐ 術前補助化学療法 ☐ 放射線併用化学療法 ☐ その他	高	N Engl J Med. 2023; 389: 2039-2051

[illegible]

②	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分	↓																				
③	ライブリバンド 生理食塩液	2100mg 250mL	点滴静注	120分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

- ✓ PEMの副作用軽減目的のために、葉酸とビタミンB12を併用
- ✓ 葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）
- ✓ ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）
- ✓ ライブリバンドの投与量、投与速度はコース数、体重によって異なるため注意が必要
- ✓ 皮膚障害Grade3→休薬 Grade2以下に回復するまで休薬
- ✓