

## 癌化学療法輸液約束処方 横紋筋肉腫 VAC

癌種

レジメン名 横紋筋肉腫 VAC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	1クール期間
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.5 mg/m <sup>2</sup> (max 2 mg)	DIV	DAY1,8,15	21日間
コスメゲン	アクチノマイシンD	ACT-D	0.045 mg/kg(max 2.5 mg)	DIV	DAY1	
エンドキサン	シクロフォスファミド	CPA	1200 mg/m <sup>2</sup>	DIV	DAY1	
ウロミテキサン	メスナ		480 mg/m <sup>2</sup>	DIV	DAY1	

### 【DAY 1】

- ① NS50ml + アロキシ1V + デキサート1.5V / 15分 ☆イメンドカプセル内服
- ② NS50ml + オンコビン \_\_\_\_\_ mg / 5分
- ③ NS50ml + コスメゲン \_\_\_\_\_ mg / 5分
- ④ NS250ml + エンドキサン \_\_\_\_\_ mg + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 60分
- ⑤ ソルデム3A500ml / 90分
- ⑥ ソルデム3A500ml / 90分
- ⑦ NS100ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分 エンドキサン投与開始4時間後
- ⑧ ソルデム3A500ml / 90分
- ⑨ ビカネイト1000ml / 120分
- ⑩ NS100ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分 エンドキサン投与開始8時間後
- ⑪ ソルデム3A500ml / 90分

### 【DAY 8, 15】

- ① NS50ml + デキサート1V / 5分
- ② NS50ml + オンコビン \_\_\_\_\_ mg / 5分
- ③ NS50ml / 5分

### 【備考】

放射線療法時、Rp③アクチノマイシン(コスメゲン)は併用しない  
 制吐剤、生食、補液量は成人量

休薬基準: Grade3の血液毒性

2021.6.28作成