

## 癌化学療法輸液約束処方 小児 1

癌種 治療抵抗性のリウマチ性疾患:全身性エリテマトーデス、全身性血管炎、  
多発性筋炎/皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、血管炎を伴う難治性リウマチ疾患

レジメン名 小児1 CPAパルス療法

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
エンドキサン	シクロフォスファミド	CPA	500~1000 mg/m <sup>2</sup>	div	2-5時間	DAY 1	4週

### 化学療法前日

13~21 ① ソルデム3A 500ml /60ml/hr  
21~05 ② ソルデム3A 500ml /60ml/hr

### 化学療法当日

05~10 ① ソルデム3A 500ml + メイロン84 20ml + フロセミド15mg /300分  
10~10:30 ② 5%Tz 50ml + グラニセトロン 2mg/1A / 30分  
10:30~11:30 ③ Ns 200 ml + ウロミテキサン300mg /60分  
11:30 ④ フロセミド 0.5A / 静注  
11:30~16:30 ⑤ Ns 500ml + エンドキサン \_\_\_\_\_ mg /300分  
16:30~17:30 ⑥ Ns 200 ml + ウロミテキサン300mg /60分  
17:30 ⑦ フロセミド 20mg0.5A / 静注  
17:30~23:30 ⑧ ソルデム3A 500ml + メイロン84 20ml1A + フロセミド20mg3/4A /300分  
側管:メインをとめて20-21 ⑨ 生食 200 ml + ウロミテキサン300mg /60分  
23~07 ⑩ ソルデム3A 500ml /60ml/hr

### 化学療法翌日

7:00~15:00 ① ソルデム3A 500ml /60ml/hr

【備考】 エンドキサンの総投与量は30gを超えないようにする。