

癌化学療法輸液約束処方 消食1

癌種

食道癌

レジメン名 消食1

5FU + CDDP + RT

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	1000 mg/m ²	civ	96 hr	DAY 1-4	28 日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²	div	120min	DAY 1	
放射線	-	-	total 50.4 Gy	-	-	-	-

[DAY 1]

- 9:00-11:00 ① ラクテック 500 ml / 120min 9:00 ☆イメンド125mg内服
 11:00-11:15 ② NS 50 ml + グラニセトロン 1A + デキサート 2V / 15min
 11:15-13:15 ③ NS 500 ml + シスプラチン mg / 120min
 11:15 側) NS 50 ml / 5min ラインキープ用
 11:15-11:15 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) mg / 24hr
 13:15-13:30 ④ NS 50 ml + メトクロプラミド 2A / 15min
 13:30-14:30 ⑤ 20%マンニトール 300 ml / 60min
 14:30-9:00 ⑥ ソルデム3A 1000 ml + ラクテック 1000 ml / 18.5hr (翌日9:00まで)

<備考>

- ① DAY1イメンド125mg、DAY2~⇒80mg
 ② セロトニン受容体拮抗薬はDAY 1のみ投与。

[DAY 2, 3]

- 9:00-翌日9:00 ① ソルデム3A 1000 ml + ラクテック 1000 ml / 24hr 9:00 ☆イメンド80mg内服
 9:15-9:30 側) NS 50 ml + デキサート 1.5V + メトクロプラミド 2A / 15min
 11:15-11:15 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) mg / 24hr

[DAY 4]

- 9:00-翌日12:00 ① ソルデム3A 1000 ml + ラクテック 1000 ml / 27hr
 9:15-9:30 側) NS 50 ml + デキサート 1.5V + メトクロプラミド 2A / 15min
 11:15-11:15 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) mg / 24hr
 11:15-11:45 側) NS 100 ml / 30min ラインフラッシュ