

全身性エリテマトーデス  
全身性血管炎、治療抵抗性のリウマチ疾患

レジメン名 腎内2 エンドキサンパルス療法

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	500 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1,29,57,85,113	180分	28日
ウロミテキサン	メスナ		CPAの40%量を3回/日	div	DAY1,29,57,85,113	30分	28日

[DAY 1, 29, 57, 85, 113]

- ① NS 50 ml/ 5分
- ② NS 250 ml + エンドキサン \_\_\_\_\_ mg / 180分【側管】④ NS 100 ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分(②投与開始と同時)
- ③ NS 50 ml/ 5分
- ⑤ NS 100 ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分(②投与開始から4時間後)
- ⑥ ヘパリンNaロックシリンジ(100単位)
- ⑦ NS 100 ml + ウロミテキサン \_\_\_\_\_ mg / 30分(⑤投与開始から4時間後)
- ⑧ NS 50 ml/ 5分

【備考】

- ・ ウロミテキサンは、エンドキサン投与時、エンドキサン投与4時間後、エンドキサン投与8時間後に投与する。
- ・ 制吐剤、hydration は必要に応じて追加する(別処方にて)。
- ・ 投与間隔は約1ヶ月毎(投与日は多少前後することあり)。
- ・ 総コース数は最大10コースとする。

H28.6.15作成