

がん化学療法輸液約束処方 頭頸2

がん種:頭頸部癌

レジメン名:頭頸2 CDDP + 5FU

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	700 mg/m ²	中心静脈	DAY 1, 2, 3, 4, 5	23日間	28日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	70 mg/m ²	中心静脈	DAY 1	27日間	

DAY 0【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml
+ アスパラカリウム 2キット / 12hr
- 21:00 ② = ① do

DAY 1【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml
+ フルオロウラシル _____ mg
+ ファモチジン 1V
+ メトクロプラミド 1A
+ アスパラカリウム 2キット / 12hr

21:00 ② = ① do

【側管】

- 9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min
- 10:00 ② NS 100ml
+ デキサート 2V + セロトーン 1A / 30min
- 10:30 ③ NS 300ml + シスプラチン _____ mg / 120min
- 12:30 ④ 20%マンニトール 300ml / 60min
- 13:30 ⑤ ソルデム3A 500ml / 180min
- 16:30 ⑥ NS 100ml + セロトーン 1A / 30min
- 17:00 ⑦ ソルデム3A 500ml / 240min
- 21:00 ⑧ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min

- * 備考 ① シスプラチンの希釈液は生理食塩水500mlから200ml抜いて使用する。
② 対象患者の全身状態によりシスプラチンの投与時間および投与後の水分負荷量(投与時間含む)は変更可とする。

DAY 2,3【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml
+ フルオロウラシル _____ mg
+ ファモチジン 1V
+ メトクロプラミド 1A
+ アスパラカリウム 2キット / 12hr

21:00 ② = ① do

【側管】

- 9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1A / 60min
- 10:00 ② NS 100ml
+ デキサート 1V + セロトーン 1A / 30min
- 10:30 ③ ソルデム3A 500ml / 180min
- 13:30 ④ ソルデム3A 500ml / 180min
- 21:00 ⑤ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min

DAY 4,5【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml
+ フルオロウラシル _____ mg
+ ファモチジン 1V
+ メトクロプラミド 1A
+ アスパラカリウム 2キット / 12hr

21:00 ② = ① do

【側管】

- 9:00 ① 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min
- 10:00 ② NS 100ml
+ デキサート 1V + セロトーン 1A / 30min
- 21:00 ③ 5%TZ 100ml + ホスホマイシン 2g 1V / 60min