【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： PANC-105

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
膵臓がん	GEM+nab-PTX	28日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク	根拠
軽度	N Engl J Med 369: 1691-703, 2013

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
②	アブラキサン 生理食塩液	125mg/㎡ 適量	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓							↓													
④	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓													
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓							↓													

＜注意事項/備考＞

✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
✓ GEM：30分かけて投与（６０分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
✓ nab-PTX：特性生物由来製品➔使用記録（氏名、住所、使用年月日、製造番号）を20年間保管
✓ nab-PTX：インラインフィルター使用禁（フィルターへのアルブミンタンパク吸着の可能性あり）
✓ nab-PTX：アルコールを含まないため、アルコール過敏症のある場合も使用可能
✓