

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： OVA-116

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん	Bv +TC tri-weekly	21日間	6コース+α	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高/中	J Clin Oncol 21: 3194-3200, 2003 J Natl Cancer Inst 95: 1320-30, 2003

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	アロキシ 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																				
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑥	アバスチン* 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目~ 30分	↓																				
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
*Bvは2コース目（以降）から開始（術後の出血の影響を考慮し、初回はBv抜き）																									
＜維持療法＞ 下記2～6コース施行後、下記Bv単独療法を最大21サイクル施行可																									
①	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ CBDCA：投与回数を重ねると、ショック、アナフィラキシー様症状の発現頻度が高くなる傾向（8コース前後）