【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： OVA-121

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
卵巣がん（再発）	Bv+PLD	28日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク	根拠
軽度	J Clin Oncol 32: 1302-8, 2014

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	30分	↓																											
②	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
③	ドキシル 5%ブドウ糖液	40mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓																											
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
④	アバスチン 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～ 30分	↓														↓													
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓													

＜注意事項/備考＞

✓ Infusion reaction：点滴開始と同時に、解熱鎮痛薬+抗ヒスタミン薬を内服
✓ PLD：5%ブドウ糖液で希釈し、1mg/minを超えない速度で投与
✓ PLD：総投与量500mg/m²以上で、心毒性のリスク増大
✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
✓