

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： RCC-101

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
腎細胞がん	Temsirolimus	7日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他

催吐リスク
最小度

根拠
N Engl J Med 356: 2271-81, 2007

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day							
					1	2	3	4	5	6	7	
①	ポララミン錠	2mg	内服	点滴開始 30分前	↓							
②	トーリセル 生理食塩液	25mg/body 250mL	点滴静注	60分	↓							
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							

<注意事項/備考>

- ✓ Temsirolimus：DEHPを含まない輸液セット、5μm以下のインラインフィルター使用
- ✓ Temsirolimus：間質性肺炎の発現に注意
- ✓ 感染症：感染症の悪化、B型肝炎ウイルス・結核ウイルスなどの再活性化の報告あり。既往を含め確認が必要
- ✓ インフュージョンリアクション：悪寒、発熱、呼吸困難などに注意。状況に応じて抗ヒスタミン薬や解熱鎮痛薬などの投与を検討。初回以外でも生じることあり
- ✓
- ✓