

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-101

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
非ホジキンリンパ腫 (CD20陽性)	Rituximab療法	7日間	4~8コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他

催吐リスク
最小度

根拠
Blood. 1997; 90: 2188-2195. Blood. 1998; 92: 1927-1932.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day							
					1	2	3	4	5	6	7	
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴静注	医師指示	↓							
【以下の分割投与も可(Infusion reaction対策)】												
①	リツキシマブ 生理食塩液	100mg 100mL	点滴静注	医師指示	↓							
②	リツキシマブ 生理食塩液	(375mg/m ² -100mg) 500mL	点滴静注	医師指示	↓							

＜注意事項/備考＞

- ✓ Infusion reaction 予防としてリツキシマブ投与開始30分前にでブルフェン200mg・ボラミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
- ✓ CD20陽性非ホジキンリンパ腫にリツキサン単独投与する場合は375mg/m²をWeeklyで4回投与
- ✓ CHOPなどの化学療法と併用する場合は最大8回まで投与可能
- ✓
- ✓
- ✓