<u>レジメン番号</u>: NHL-120

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数 適応		催吐リスク	根拠
非ホジキン リンパ腫	Bendamustine	21日間	6~8コース	□ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	ф	Blood. 2007; 110; 406a(abstr 1351).

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	±5 Day																				
	<b>朱</b> 四石	(なが)	経路	時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 1	1	12 13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	1																				
	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分		<b>†</b>																			
	トレアキシン	120mg/m²	上汝歩	00()																					
2	2 生理食塩液	250mL(合計)	点滴静注	60分	1	1																			
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	1	1																			
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	1	<b>1</b>																			

## <注意事項/備考>

,	海血		低悪性度B細胞性NHLおよびMCL	
✓	週心	٠	ID: 本性及B細胞性NHLのよびNICL	

✓ 血管痛予防のためトレアキシン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与

./