

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-121

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	BR療法 (R-Bendamustine)	28日間	6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	Blood. 2009; 114: abstr 405. Lancet. 2013; 381: 1203-1210.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴静注	医師指示	↓																											
②	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	5分	↓																											
③	トレアキシン 生理食塩液	90mg/m ² 250mL(合計)	点滴静注	60分	↓	↓																										
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																										
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																										

<注意事項/備考>

- ✓ 適応：低悪性度B細胞性NHLおよびMCL
- ✓ Infusion reaction 予防としてリツキシマブ投与前にでブルフェン200mg・ボラミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
- ✓ 血管痛予防のためトレアキシン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与