【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NHL-126

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	Brentuximab vedotin	21日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	軽度	J Clin Oncol. 2012; 30: 2183-2189.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート	6.6㎎	点滴静注	30分	↓																				
	生理食塩液	50mL																							
②	アドセトリス	1.8㎎/㎏	点滴静注	30分	↓																				
	生理食塩液	100/250mL																							
	アドセトリス希釈液量　30≦Bw≦85㎏⇒100mL　　Bw＞85㎏⇒250mL																								
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

✓ 適応：CD30陽性未分化大細胞リンパ腫

✓ アレルギー予防として点滴開始(DEX)と同時にブルフェン・ポララミン内服

✓ 末梢神経障害　Grade2,3の場合→休薬、Grade1に回復後アドセトリス1.2㎎/㎏に減量して再開