

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NHL-135+(維持)136

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
CD20陽性 FL	G-Benda 療法	下記参照	6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	<GALLIUM試験> N Engl J Med. 2017; 377: 1331-1344.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
【導入療法】1コース:4週間																																
①	プレドニン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30分	↓								(↓)																			
②	ガザイバ 生理食塩液	1000mg/Body 250mL(合計)	点滴静注	医師 指示	↓								(↓)																			
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓							(↓)																			
④	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																											
⑤	トリアキシソ 生理食塩液	90mg/m ² 250mL(合計)	点滴静注	60分	↓	↓																										
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																										
⑥	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																										
【維持療法】2ヶ月ごとに投与																																
①	プレドニン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30分	↓																											
②	ガザイバ 生理食塩液	1000mg/Body 250mL(全量)	点滴静注	医師 指示	↓																											
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											

<注意事項/備考>

- ✓ ガザイバ投与前にPSL注射、ブルフェン200mg、ポララミン2mg内服
- ✓ 1コース目のみ、ガザイバDay8、15にも投与
- ✓