

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NHL-140

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非ホジキンリンパ腫	BR療法 (R-Bendamustine)	21日間	6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	国内第Ⅲ相臨床試験(2017002試験)資料より

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 500mL	点滴静注	医師指示	↓																				
②	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	5分	↓																				
③	トリアキシン 生理食塩液	120mg/m ² 250mL(合計)	点滴静注	60分	↓	↓																			
	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																			
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																			

<注意事項/備考>

- ✓ 適応：再発又は難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
*FL、MCLとはトリアキシンの用量、休薬期間が異なるので注意
- ✓ Infusion reaction 予防としてリツキシマブ投与前にブルフェン200mg・ポララミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
- ✓ 血管痛予防のためトリアキシン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与