【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NHL-145

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
DLBCL	Pola+R-CHP	21日間	6コース	□ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク
高

根拠
N Engl J Med. 2022; 386(4): 351-363. (POLARIX試験)

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/㎡ 100mL	点滴静注	医師指示	↓																											
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
③	ポライビー 生理食塩液	1.8mg/kg 50/100mL	点滴静注	5分	↓																											
	体重＜45kgの場合は生理食塩液50mLに希釈																															
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
⑤	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																											
⑥	ドキソルビシン 生理食塩液	50mg/㎡ 100mL	点滴静注	10分	↓																											
⑦	エンドキサン 生理食塩液	750mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓																											
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																											
⑨	プレドニン錠	100mg	内服		↓	↓	↓	↓	↓																							

＜注意事項/備考＞

✓ Infusion reaction予防としてリツキシマブ投与前にブルフェン200mg・ポララミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
✓ DXR：アントラサイクリン系薬剤を使用した前治療歴確認、累積投与量500mg/㎡以上で心筋障害発生リスク↑
✓ 治療開始前には心エコー検査
✓ CPA：十分な水分の摂取と頻回な排尿を心がける
✓