

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

◀無断転載禁止▶

レジメン番号: BTC-102

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
胆道がん	GC療法	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	N Engl J Med 362: 1273-81, 2010

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	250mL	点滴静注	60分	↓								↓												
②	デキサート アロキシ 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓									↓											
③	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓									↓											
④	シスプラチン 生理食塩液	25mg/m ² 500mL	点滴静注	120分	↓									↓											
⑤	生理食塩液	250mL	点滴静注	60分	↓									↓											

＜注意事項/備考＞

- ✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
- ✓ GEM：血管痛に注意、30分で投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
- ✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
- ✓ 聴力障害（CDDP）：総投与量300mg/m²以上で高音域の聴力低下、耳鳴りなどの発現↑
- ✓
- ✓