【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： BTC-103

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
胆道がん	short-hydration GC療法	21日間	規定なし	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク	根拠
高	N Engl J Med 362: 1273-81, 2010

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓													
②	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	30分	↓							↓													
③	硫酸Mg 生理食塩液	8mL 250mL	点滴静注	30分	↓							↓													
④	シスプラチン 生理食塩液	25mg/㎡ 250mL	点滴静注	30分	↓							↓													
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓													

＜注意事項/備考＞

✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
✓ GEM：血管痛に注意、30分で投与（６０分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
✓ 聴力障害（CDDP）：総投与量300㎎/㎡以上で高音域の聴力低下、耳鳴りなどの発現↑
✓
✓